

SUPREMACY

AUTORIZZAZIONE BIOCIDA N° IT/2023/00841/MRP ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO A BASE DI CEREALI

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum	0,0027 g
Sostanze appetibili e adescanti q.b. a	100 g

Formulazione

Miscela composta da mais spezzato, avena fioccata, semi di girasole interi, zucchero.

Caratteristiche

SUPREMACY è una miscela di cereali di ultima generazione altamente appetibile (mais spezzato, avena fioccata, semi di girasole interi, zucchero), per il controllo di topi domestici, arvicole comuni, ratti grigi e ratti neri in tutte le fasi di sviluppo. Contiene brodifacoum, un principio attivo altamente potente che agisce anche con una singola ingestione, fornendo il pieno controllo delle popolazioni di roditori e superando le resistenze conosciute. Grazie alla sua modalità d'azione, la morte dei roditori avviene senza destare alcun sospetto verso l'esca da parte degli altri componenti della colonia. SUPREMACY contiene uno speciale additivo -fluorescente (Tecnologia Fluo-NP®) che rende l'esca e le feci chiaramente visibili quando illuminate con lampada UV, ciò permette il monitoraggio dell'attività dei roditori. Questa esca rodenticida è ideale per trattamenti di ratti neri e arvicole e in situazioni in cui l'alimentazione dei roditori è prevalentemente a base di cereali, come in edifici rurali e zootecnici, granai, porcilaie e in aree sensibili civili e industriali (produzione di mangimi, lavorazioni di farine, mulini, ecc.).

SUPREMACY contiene una sostanza amaricante (Denatonium Benzoate) atta a ridurre il rischio d'ingestione accidentale da parte di bambini. L'antidoto (Vitamina K1) risulta di facile reperibilità. Prodotto ad uso specifico di professionale specializzato.

Misure di mitigazione del rischio

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso. Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti. Non usare il prodotto come esca permanente per la prevenzione d'infestazioni da roditori o per il monitoraggio dell'attività dei roditori. Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'. Non impiegare in aree dove vi è il sospetto di resistenza alla sostanza attiva. Non usare i prodotti oltre 35 giorni senza una valutazione del livello dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento. Per un'appropriata gestione delle resistenze, non alternare l'uso di anticoagulanti differenti ma con efficacia paragonabile o inferiore. Considerare l'uso di rodenticidi non-anticoagulanti, se disponibili, oppure di un anticoagulante più efficace.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Tel. 049|9500588

www.pestnet-europe.it

Dosi e modalità d'impiego

Il prodotto è pronto all'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione debitamente marcati, in punti esca coperti e protetti o direttamente nelle tane.

Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione. Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca. Il prodotto deve essere usato unicamente all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo. Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture. I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti. Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento.

Dosi e frequenza d'impiego:

- **Per il controllo dell'Arvicola comune (*Microtus arvalis*) e del Topo domestico (*Mus musculus*)** - Uso all'interno ed esterno intorno agli edifici ed in aree aperte: 45-50 g di prodotto per ogni punto esca.
- **Per il controllo di ratti (*Rattus norvegicus* e *Rattus rattus*)** - Uso all'interno ed esterno intorno agli edifici ed in aree aperte: 90-100 g di prodotto per ogni punto esca.
- **Per il controllo del ratto grigio (*Rattus norvegicus*)** - Uso in discariche di rifiuti: 90-100 g di prodotto per ogni punto esca.

Confezioni di vendita

Cartone da 10 Kg



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)
Tel. 049|9500588
www.pestnet-europe.it